HOE MOVIPREP® **TE GEBRUIKEN** VOOR EEN **OPTIMAAL RESULTAAT?**



1 Open de verpakking van MOVIPREP® en open 1 plastic folie met zakje A en zakje B.

Leeg ZOWEL zakje A als B in een maatbeker van 1 liter. Giet water in de beker tot aan het merkteken van 1 liter.

2

3 Roer de oplossing tot het poeder geheel is opgelost. Dit kan 5 minuten duren.

Giet de oplossing in een glas.

4



5 Drink de vloeistof binnen 1 à 2 uur op. Drink bijvoorbeeld iedere 10 à 15 minuten een glas totdat de kan leeg is.

Drink naast iedere liter MOVIPREP® ten minste een halve liter heldere vloeistof, zoals bijvoorbeeld water, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlees, frisdranken, thee of koffie zonder melk. Hoe meer u drinkt, hoe beter het resultaat!

6



7 Herhaal stap 1 tot 6 voor de tweede liter MOVIPREP® oplossing. Gebruik hiervoor de tweede folie met zakje A en zakje B.

Drink 1 liter MOVIPREP® oplossing na de avondmaaltijd. Drink 1 liter MOVIPREP® oplossing in de morgen. Inname van 2 liter op de dag voor het onderzoek is ook mogelijk. Vergeet ook niet ten minste een halve liter heldere vloeistof te drinken, zoals vermeld in punt 6.



8

(of volg het schema van uw arts/verpleegkundige)